



## معلومات عن مسببات الأمراض لدى الإنسان - النظافة وقاية

عدوى بكتيريا العطيفة هي بكتيريا تسبب أمراض إسهال معدية، تظهر في جميع أنحاء العالم، وفي أوروبا خصوصاً في الموسم الحار. تعيش البكتيريا بشكل رئيسي في الجهاز الهضمي للحيوانات. غالباً دون أن يكون الحيوان نفسه مصاباً بالمرض. تعتبر بكتيريا العطيفة من المسببات البكتيرية الأكثر شيوعاً لأمراض الإسهال في ألمانيا.

### ما بكتيريا العطيفة؟

### كيف تنتقل بكتيريا العطيفة؟

#### عبر المواد الغذائية

تنتقل عدوى بكتيريا العطيفة بشكل رئيسي من خلال تناول المواد الغذائية الملوثة ببكتيريا. وتنتقل العدوى في كثير من الأحيان عبر لحوم الدواجن. خلافاً لبكتيريا السالمونيلا فإن بكتيريا العطيفة لا يمكن لها أن تتكاثر في المواد الغذائية، لكنها تعيش وتبقى رغم ذلك فترة من الزمن في البيئة المحيطة. وقد يتسبب تدني مستوى النظافة الصحية في المطبخ إلى انتقال العدوى، مثلاً من خلال الأدوات التي لا تتنفس بشكل كافٍ عقب إعداد اللحوم النيئة مثل لوحات التقطيع أو السكاكين.

#### المواد الغذائية الأكثر عرضة للتلوث ببكتيريا العطيفة

- ◀ لحوم الدواجن ومنتجاتها التي لم تتعرض لدرجة حرارة كافية.
- ◀ الحليب غير المبستر ومنتجاته.
- ◀ اللحم المفروم غير المطبوخ بالكامل.
- ◀ النقانق الطازجة النيئة مثل السجق الألماني.
- ◀ مياه الشرب الملوثة، مثل مياه الآبار.

#### من شخص لآخر

من الممكن أيضاً أن تنتقل العدوى من شخص لآخر باللامس الممعدي. حيث تنتقل مسببات الأمراض الكائنة في بقايا براز الشخص المصاب عبر الأيدي الملوثة إلى الفم.

#### عن طريق الاتصال المباشر بالحيوانات

أصحاب الحيوانات يمكن أن تنتقل إليهم العدوى عن طريق حيواناتهم الآلية. تنتقل مسببات الأمراض في هذه الحالة عبر براز الحيوانات.

#### عن طريق المياه الملوثة

في بعض الأحيان تكون مياه البحيرات ملوثة ببكتيريا العطيفة. وقد تنتقل العدوى في حالات نادرة عن طريق المياه الملوثة وذلك في حالة ابتلاء المياه في أثناء السباحة.

### ما أعراض المرض؟

عادةً ما تبدأ الحالة المرضية بحمى وصداع وألام في العضلات، تليها آلام شديدة ونفاسات في البطن وقيء وإسهال. وقد يكون الإسهال طرياً أو مائيًّا للغاية أو حتى دمويًّا. وعادةً ما تستمر الحالة المرضية لفترة أسبوع واحد، وتمر دون مضاعفات وتختفي الأعراض من تلقاء نفسها. والعديد من حالات الإصابة ببكتيريا العطيفة تمر دون أي أعراض.

ويعد التهاب المفاصل الروماتزمي أو التهاب السحايا من **المضاعفات** التي قد تحدث في حالات استثنائية، علاوةً على أمراض الجهاز العصبي في حالات نادرة جدًا كمتلازمة جيلان باريه (التهاب الأعصاب الحاد المزيل للنخاعين) والتي قد تؤدي إلى الإصابة بالشلل.

عادةً ما تفصل فترة من 2 إلى 5 أيام بين اكتساب العدوى وظهور المرض، وفي بعض الحالات الفردية قد تستغرق الفترة من 1 إلى 10 أيام. ويظل المريض معيناً ما دام استمر إفراز مسببات الأمراض مع البراز، ويستغرق ذلك في المتوسط من 2 إلى 4 أسابيع، أي أنه حتى بعد اختفاء أعراض المرض من الممكن أن يستمر إفراز مسببات المرض مع البراز.

### متى يظهر المرض ومتى يكون المريض معدياً لغيره؟

في حين يظل الأشخاص ذوو المناعة الضعيفة حاملين للعدوى لفترة أطول وذلك عن طريق البراز.

الأطفال الصغار هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. كما تكثر الإصابة في كثير من الأحيان بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً. وبصفة عامة، إن الرضع والأطفال الصغار وكبار السن وضعيفي المناعة بوجه خاص مهددون أكثر من غيرهم بالإصابة بالعدوى.

### من هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض؟

- ◀ على المريض أن يلزم منزله خلال فترة احتدام المرض وأن يتتجنب المجهود البدني.
- ◀ على المريض أن يحرص بشكل خاص على نظافة الأيدي. يتعين غسل اليدين بالماء والصابون جيداً بعد استخدام دورة المياه.
- ◀ في حالة الإسهال الشديد والقيء، ينبغي الحرث على تحقيق التوازن وتعويض فقدان السوائل والأملاح في الجسم، وهو ما يعني الإكثار من الشرب في المقام الأول.
- ◀ ينبغي الحرث على تناول الأطعمة سهلة الهضم بكميات كافية من الملح.
- ◀ لتعويض فقدان الأملاح ، يمكن استخدام ما يسمى بالمحاليل الإلكتروليتية البديلة من الصيدلية إذا لزم الأمر.

### ما الذي ينبغي فعله في حالة المرض؟



## معلومات عن مسببات الأمراض لدى الإنسان - النظافة وقاية

### ما الذي ينبغي فعله في حالة المرض؟

- ◀ يعد الأطفال وكبار السن أكثر حساسية من غيرهم فيما يتعلق بفقدان الجسم للسوائل، لذا ينبغي استشارة الطبيب، لا سيما إذا استمر الإسهال لمدة أطول من 2 إلى 3 أيام. وتعالج الإصابة ببكتيريا العطيفة إذا لزم الأمر بالمضادات الحيوية.
- ◀ ينبغي أن يتفادى المصابون بالمرض تحضير الطعام للآخرين.
- ◀ وفي حالة التعامل مع بعض المنتجات الغذائية في الإطار المهني والإصابة بقيء و/ أو إسهال معدني، ينبغي التوقف عن العمل لفترة مؤقتة.
- ◀ لا يسمح للأطفال دون السادسة، الذين يثبت إصابتهم بقيء و/ أو إسهال معدني أو يُشتبه في إصابتهم بذلك، بالذهاب إلى المرافق الاجتماعية كالمدارس ورياض الأطفال. وينبغي على الآباء إبلاغ تلك المرافق الاجتماعية بإصابة طفليهم بالمرض. وعادة لا يُسمح بزيارة تلك المرافق إلا بعد مرور يومين على زوال الأعراض، إلا أن الجهة الصحية المختصة هي المنوطة بتحديد الموعد المحدد.
- ◀ لا يُشترط تقديم شهادة طبية مكتوبة.

### كيف يمكن الوقاية من المرض؟

بكتيريا العطيفة هي بكتيريا حساسة نسبياً حيث لا تستطيع التكاثر في المواد الغذائية ولكنها تعيش لفترة قد تصل أحياناً إلى أشهر على المواد الغذائية المجمدة، وتبقى وبالتالي حاملة للعدوى حتى بعد إذابتها.

- ◀ الحرص دائمًا على طهي الطعام جيداً وخاصة لحوم الدواجن! التحمير الخفيف لا يكفي للقضاء على مسببات المرض.
- ◀ ينبغي التخلص من الماء الناجم عن ذوبان الدواجن المجمدة وغيرها من أنواع اللحوم مباشرة وتنظيف أسطح العمل والأدوات المستخدمة في إعدادها بالماء الساخن وغسل اليدين جيداً.
- ◀ تجنب غسل لحوم الدواجن قبل الطهي، وبالتالي تتجنب انتشار مسببات الأمراض عن طريق رذاذ الماء في المطبخ.
- ◀ يُنصح باستخدام أواني منفصلة للأطعمة النيئة والمطبوخة وتنظيف أدوات وأسطح المطبخ بالماء الدافئ والمنظفات جيداً وتحفيفها بعد كل استخدام.
- ◀ يُنصح باستبدال مناشف المطبخ وأقمشة التنظيف باستمرار وغسلها في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة مئوية.
- ◀ يُنصح باستبدال فرش غسل الأطباق والإسفنج باستمرار.
- ◀ ينبغي على الأطفال الرضيع والأطفال الصغار والمسنين والأشخاص ذوي الجهاز المناعي الضعيف تجنب أطعمة مثل منتجات الحليب الخام أو اللحوم غير المطهية بشكلٍ كافٍ.
- ◀ يُنصح بعالي الحليب الخام غير المعالج قبل التناول ويُفضل استخدام الحليب المبستر.

### المحافظة على نظافة اليدين

غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد كل استخدام لدوره المياه وكذا إعداد الطعام وقبل الأكل! ينبغي الحرص أيضاً على النظافة التامة للأيدي قبل إعداد الطعام وبعد ملامسة الأطعمة النيئة، خاصة لحوم الدواجن النيئة. ينبغي تجفيف الأيدي بعناية بمنشفة نظيفة بعد غسلها.

### أين يمكنني الاستعلام؟

- مكتب الصحة القريب منكم يقدم لكم المعلومات والمشورة. ونظراً لأنه يجب الإبلاغ عن حالات تشيسي المرض، لذا تتوفر في مكاتب الصحة معلومات حول الوضع الحالي للمرض وخبرات كبيرة في التعامل معه.
- لمزيد من النصائح للجمهور حول هذا المرض، يُرجى الإطلاع على صفحة المركز الاتحادي لتنقيم المخاطر الصحية ([www.bfr.bund.de](http://www.bfr.bund.de)) والمكتب الاتحادي لحماية المستهلك وسلامة الأغذية ([www.rki.de/campylobacter](http://www.rki.de/campylobacter)).
- لمزيد من المعلومات عن أعراض المرض، يمكنكم الإطلاع أيضاً على الموقع الإلكتروني لمعهد روبرت كوخ ([www.infektionsschutz.de](http://www.infektionsschutz.de)).

#### الناشر:

المركز الاتحادي للتوعية الصحية، كولونيا.  
جميع الحقوق محفوظة.

أعد بالتعاون مع الرابطة الاتحادية لطبيبات وأطباء الخدمة العامة وبالتنسيق مع معهد روبرت كوخ.  
هذه المعلومات متاحة للتحميل مجاناً على موقع ([www.infektionsschutz.de](http://www.infektionsschutz.de)).



STEMPEL